



diclotica[®]

marka



diclotica[®]

wyrób medyczny

thermal

UNIWERSALNY PLASTER ROZGRZEWAJĄCY

bóle mięśniowe, zmęczenie mięśni, lumbago, ból pleców, sztywność barków, bóle związane z zapaleniem stawów

Zawiera składnik o skutecznym działaniu - **kapsaicynę**



Ukierunkowane, intensywne i długotrwałe **uśmierzanie bólu**



Niezawodna **przyczepność**




Dwa rozmiary:

Rozmiar M - 10 x 14 cm

Rozmiar L - 14 x 18 cm

NA BÓL MIĘŚNI I STAWÓW



diclotica[®]

produkt leczniczy OTC

Diclofenacum natricum
10 mg/g, żel

- SZYBKO I DOBRZE SIĘ WCHŁANIA
- NIE ZOSTAWIA ŚLADÓW NA SKÓRZE I ODZIEŻY
- BEZ ZAPACHU

Nazwa produktu leczniczego: Diclotica (Diclofenacum natricum). **Postać farmaceutyczna moc i dawka substancji czynnej:** żel, biały lub prawie biały, delikatny, jednorodny żel, o kremowej konsystencji, 10 mg/g. **Skład:** 100 g produktu zawiera 1 g diklofenaku sodowego. **Substancje pomocnicze o znanym działaniu:** każdy gram żelu zawiera 0,5 mg, propylu parahydroksybenzoenu (E 216), 0,5 mg metylu parahydroksybenzoenu (E 218) i 80 mg glikolu propylenowego. **Wskazania do stosowania:** Produkt Diclotica jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. **Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.** Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorosli i młodzieży powyżej 14 lat: w pourazowych stanach zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorosli (powyżej 18 lat): ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. **Dawkowanie i sposób podania:** Dorosli i młodzieży powyżej 14 lat: Nakładać cienkie warstwy żelu Diclotica na bolące miejsca, 3 do 4 razy na dobę w zależności od potrzeby 2 g do 4 g produktu leczniczego co w przybliżeniu odpowiada 2,0-2,5 cm i jest wystarczające do posmarowania powierzchni około 400 cm² do 800 cm². Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. W przypadku stosowania produktu leczniczego bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż 14 dni w przypadku pourazowych stanów zapalnych i reumatyzmu tkanek miękkiej i nie dłużej niż 4 tygodnie w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów. **Dawkowanie i sposób podania:** Osoby w podeszłym wieku powyżej 65 lat należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych. Po zastosowaniu należy umyć ręce, chyba że to one są poddawane leczeniu. Diclotica może być używany jako leczenie wspomagające doustne podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżytowe błony śluzowej są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ; trzeci trymestr ciąży; u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. **Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Działania niepożądane po podaniu miejscowym diklofenaku występują rzadziej niż po podaniu doustnym. W zakresie, w jakim istnieje możliwość absorpcji skórnej produktu Diclotica, nie można wykluczyć wystąpienia skutków ogólnoustrojowych. Ryzyko ich wystąpienia zależy między innymi od powierzchni skóry poddanej działaniu produktu leczniczego, zastosowanej ilości i czasu ekspozycji. **Bezpieczeństwo Skórne NLPZ:** bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne, niektóre śmiertelne, w tym złuszczone zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielenie się naskórki, związane ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Ryzyko wystąpienia tych reakcji jest większe na początku leczenia, ponieważ w większości przypadków reakcje te pojawiają się w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Diklofenak należy odstawić w momencie wystąpienia pierwszych objawów wysypki, zmian dotyczących błon śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości. Diclotica można stosować tylko zdrową skórę (nie stosować na otwarte rany). Diclotica nie może wchodzić w kontakt z tkanką łączną ani błonami śluzowymi. Nie dotykać. Powierzchnia, na którą stosowany jest żel Diclotica, nie może być narażona na działanie promieni słonecznych. Diclotica należy stosować ostrożnie u pacjentów z wywiadem astmy i choroby wrzodowej. Diclotica jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży. Diclotica zawiera propylu parahydroksybenzoenu i metylu parahydroksybenzoenu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Zawiera również glikol propylenowy, który podczas miejscowego stosowania produktu leczniczego może powodować podrażnienie skóry. Działania niepożądane: często (≥1/100 do <1/10) Wysypka skórna z pęcherzykami, pokrzywka, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry), rzadko (≥1/10000 do <1/1000) Pęcherzykowe zapalenie skóry, bardzo rzadko (<1/10 000) Wysypka grudkowata, obrzęk naczyniowo-ruchowy, nadwrażliwość pokrzywka, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielenie się naskórki, sapanie, splyczony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, astma, obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani, świąd, zaczerwienienie, rumień lub wykwitły skórne miejscowe lub ogólnoustrojowe, reakcje nadwrażliwości na światło, zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne, objawy nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami. **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4; 44-100 Gliwice. **Numer pozwolenia Prezesa URPLWMPB:** 24792. **Produkt dostępny bez recepty:** OTC.